

# Ragondin

*Myocastor coypus*

Le Ragondin  
est grégaire  
et polygame.



ORDRE RONGEURS (RODENTIENS) | FAMILLE MYOCASTORIDÉS | LONGÉVITÉ 10 ANS

**DESCRIPTION** Ce gros rongeur de 68 cm à 1 m de long, dont 30 à 40 cm de queue, pèse à l'âge adulte de 4 à 10 kg. Le dessous du ventre et le tour des oreilles sont orangés ; le dessus du pelage est brun plus ou moins foncé. Le bout de museau et le menton sont blancs et la face externe des incisives est orange. Sa queue est cylindrique, peu velue et écailleuse. Le Ragondin est bien adapté à la vie aquatique : pattes arrières palmées, lèvres obturables derrière les incisives, narines valvulaires, bourre imperméable, yeux et oreilles petits et situés haut sur la tête et visibles quand l'animal nage, tétines de la femelle sur les flancs, au-dessus de la ligne de flottaison. Il peut vivre jusqu'à 10 ans.

**REPRODUCTION** Le Ragondin s'accouple surtout à la fin de l'hiver et à l'automne. La femelle donne naissance de 2 à 7 jeunes, une à deux fois par an, qui savent nager au bout de quelques heures. La gestation est de 127 à 138 jours et les petits sont sevrés dès l'âge de 6 à 10 semaines.

**RÉGIME ALIMENTAIRE** Il apprécie les pousses de carex, les roseaux, les écorces de jeunes arbres, les rhizomes. Il peut occasionner des dégâts dans les cultures de betteraves, de choux, de colza et de maïs. Le Ragondin mange parfois des mollusques d'eau douce.

**MODE DE VIE & COMPORTEMENT** Animal plutôt nocturne et crépusculaire mais qui peut être facilement observé en pleine journée, le Ragondin est grégaire et polygame. Il vit dans un terrier, creusé dans une berge, et cause ainsi de nombreux dégâts dans les berges de cours d'eau et les digues d'étangs (le terrier pouvant mesurer 10 m de long). L'entrée, de 20 cm de diamètre, est souvent à moitié submergée et conduit à un nid d'herbes sèches.

Ses prédateurs principaux sont les chiens errants, le Renard roux, certains mustélidés (le Putois par exemple), le Busard des roseaux..., qui peuvent capturer les jeunes ragondins. L'espèce n'hiberne pas.

## EN BREF...

### HABITAT

Rivières lentes, marais, lagunes.

### TAILLE

De 68 cm à 1 m, dont 30 à 40 cm de queue.

### POIDS

De 4 à 10 kg.

### COULEURS

Pelage brun. Oreilles et dessous du ventre orangés. Bout du museau et menton blancs, face externe des incisives de couleur orange.

### BRUITS

Menacé, le Ragondin grogne.

### NOURRITURE

Pousses de carex, roseaux, écorces de jeunes arbres, rhizomes...

### REPRODUCTION

De 2 à 7 petits par portée (1 à 2 portées par an).



**HABITAT** Il fréquente de nombreux types de milieux aquatiques (rivières lentes, marais, lagunes) et occupe les plans d'eau temporaires qu'il quitte quand ceux-ci s'assèchent. Il préfère les eaux stagnantes envahies de végétation. Le Ragondin se rencontre presque partout en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Sud-Ouest du Royaume-Uni.

**DIUERS** Ses crottes sont cylindriques, verdâtres et effilées à une extrémité. Importé en France pour sa fourrure, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle d'Amérique du Sud, il s'est développé très vite sur le territoire national. Il peut être vecteur de certaines maladies transmissibles à l'homme comme la leptospirose.



Ragondin *Myocastor coypus*